


<b>Verfahrensstandard: Verbandwechsel chronischer Wunden -stationär-</b>	WZ-VS-010 V04 Verbandwechsel chronischer Wunden -stationär-	 Wundzentrum Hamburg <small>überregionales Wundnetz</small>
	gültig bis: 18.03.2020	Seite 1 von 2

<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordiniertes Vorgehen aller an der Wundversorgung beteiligten Personen</li> <li>• Anleitung zu hygienischen Notwendigkeiten für alle an der Behandlung beteiligten Personen beim Wechseln von Verbänden</li> <li>• Vermeiden von kritischer Kolonisation und Infektion</li> <li>• Förderung des Wundheilungsprozesses und der Lebensqualität</li> </ul>

<b>Grundsätzliches</b>
Jede Wunde ist aseptisch zu behandeln, da Keimbesiedelung eine Wundheilung behindert und in einigen Fällen unmöglich macht.


<b>Vorbereitung</b>
<p>Festlegen der Reihenfolge: von rein zu unrein, Planung entsprechend erstellen.</p> <p><b>1. Aseptische Wunden    2. Kontaminierte und kolonisierte Wunden    3. Infizierte Wunden</b>  <b>4. Wunden mit multiresistenten Erregern (MRE), z. B. MRSA, VRE, 3 und 4MRGN sowie Keimen, die weiterführende Schutzmaßnahmen erfordern.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktuelle Information über durchzuführenden Verbandwechsel der Dokumentation entnehmen</li> <li>• Patienteninformation</li> <li>• Analgetikagabe bedenken und Wirkeintritt abwarten</li> <li>• Nutzung von Verbandwagen und/oder Tablettssystem</li> <li>• Bei Nutzung von Tablettssystem werden die Materialien auf einem wischdesinfizierten Tablett ins Zimmer gebracht; Materialien, die nicht benutzt werden, verbleiben im Zimmer oder werden dort verworfen; ggf. Entsorgungsbehälter für spitze Gegenstände mitnehmen</li> <li>• Arbeitsfläche im Patientenzimmer schaffen, z. B. Patientenklapptisch (Wischdesinfektion); nichts im Patientenbett ablegen</li> <li>• Steriles Material patientenfern und unsteriles Material patientennah anordnen</li> <li>• Abwurfbehälter bereitstellen</li> <li>• Fenster und Türen schließen</li> <li>• Keine anderen Tätigkeiten während des Verbandwechsels im Patientenzimmer, wie Putzarbeiten oder Betten machen</li> <li>• Unbeteiligte Personen sowie Besucher fernhalten; ggf. Sichtschutz aufstellen</li> <li>• Patientenbett auf Arbeitshöhe bringen</li> <li>• Patienten entsprechend positionieren und Bettschutz unterlegen</li> <li>• Auf gute Beleuchtung achten</li> <li>• Schutzkleidung/Einmalschürze anziehen (keine langärmelige Kleidung tragen)</li> <li>• Vorbereitung der benötigten Utensilien</li> <li>• Hygienische Händedesinfektion und Einmalhandschuhe anziehen</li> </ul>

<b>Durchführung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung der Non-Touch-Technik</li> <li>• Bei aufwendigen Verbandwechseln eine zweite Person zum Anreichen hinzuziehen</li> <li>• Alten Verband mit Einmalhandschuhen und tieferliegende Tamponaden mit steriler Pinzette oder sterilen Handschuhen entfernen</li> <li>• Inspektion der alten Wundaufgabe, danach im bereitgestellten Abwurfbehälter entsorgen</li> <li>• Handschuhwechsel und hygienische Händedesinfektion</li> <li>• Aseptische Wundreinigung, d. h. alle Wunden werden von innen nach außen gereinigt, um nicht weitere Keime in die Wunde zu schieben</li> <li>• Wundumgebung nicht tupfen sondern wischen; pro Wischvorgang eine neue/n sterile/n Kompresse/Tupfer verwenden</li> <li>• Wundreinigung/-spülung z. B. mit physiologischer Kochsalzlösung oder Ringerlösung (nach ärztlicher Verordnung)</li> <li>• Kritisch kolonisierte und infizierte Wunden mit einem zeitgemäßen Antiseptikum (nach ärztlicher Verordnung) reinigen</li> <li>• Inspektion der gereinigten Wunde</li> <li>• Handschuhwechsel und hygienische Händedesinfektion</li> </ul>

Erstellt/Revidiert: Standardgruppe WZHH	Überprüft: Leiter der Standardgruppe	Freigegeben: 1. Vorsitzender WZHH
Datum: 25.01.2018	Datum: 19.03.2018	Datum: 19.03.2018

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phasengerechte und individuell angepasste Versorgung der Wunde nach ärztlicher Verordnung</li> <li>• Verband fixieren</li> <li>• Handschuhe entsorgen und hygienische Händedesinfektion</li> </ul>
<b>Nachsorge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patient in eine angenehme, gewünschte Position bringen (wenn möglich)</li> <li>• Patientenrufanlage und gewünschte Gegenstände (z. B. Trinkbecher, Fernbedienung, Telefon) in Reichweite bringen</li> <li>• Abschließende Wischdesinfektion der Arbeitsfläche (Flächendesinfektionsmittel)</li> <li>• Müllbeutel verschließen, erneuern und außerhalb des Zimmers entsorgen</li> <li>• Gebrauchte Mehrfachinstrumente zur Resterilisation geben. Trockenentsorgung bevorzugen, ansonsten Instrumente in Desinfektionslösung bis zur Wiederaufbereitung lagern*</li> </ul> <p><b>*Achtung:</b> „In Krankenhäusern mit einer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) erfolgt ein Transport der kontaminierten Medizinprodukte in geschlossenen Systemen (...) zur AEMP. Die Trockenentsorgung ist als schonendere Methode in Richtung Werterhalt immer vorzuziehen. (...) Bei der Nassentsorgung werden die Instrumente vorzugsweise in eine Lösung eines Reinigungsmittels oder eines kombinierten Reinigungs- und Desinfektionsmittels eingelegt, welches keine proteinfixierende Wirkung besitzt.“ (Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung 2017, S. 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hygienische Händedesinfektion</li> <li>• Dokumentation und Führung des Wundprotokolls</li> </ul>

<b>Hinweise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Information (IN 009) „Information: MRSA“</li> <li>• Siehe Information (IN 010) „Information: VRE“</li> <li>• Siehe Information (IN 011) „Information: MRGN“</li> <li>• Siehe Verfahrensstandard (VS 001) „Multiresistente Erreger (MRE) im Krankenhaus“</li> <li>• Siehe Verfahrensstandard (VS 003) „Multiresistente Erreger (MRE) im Pflege- und Altenheim“</li> <li>• Siehe Verfahrensstandard (VS 004) „Multiresistente Erreger (MRE) in ambulanten Einrichtungen“</li> <li>• Siehe Verfahrensstandard (VS 007) „Multiresistente Erreger (MRE) in der podologischen Praxis“</li> <li>• Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung. Instrumente werterhaltend richtig aufbereiten. 11. A. Gütersloh 2017; www.a-k-i.org (letzter Zugriff 17. März 2018).</li> <li>• Arbeitskreis „Krankenhaus- &amp; Praxishygiene“ der AWMF. Leitlinien zur Hygiene in Klinik und Praxis. Anforderungen der Hygiene bei chronischen und sekundär heilenden Wunden. 2014. AWMF-Leitlinien-Register, Nr. 029/042, Entwicklungsstufe 1 + IDA.</li> <li>• RKI Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut. Infektionsprävention in Heimen. Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz. 2005; 48(9): 1 061–1 080.</li> </ul>
--

Erstellt	Geprüft auf Richtigkeit / Inhalt	Freigabe im Wundzentrum	Freigabe und Inkraftsetzung	
25.01.2018	19.03.2018	19.03.2018		
Standardgruppe des Wundzentrum Hamburg e.V.	 <b>Dr. Pflugradt</b> Ltg. Standardgruppe	 <b>Dr. Münter</b> 1. Vorsitzender WZHH	PDL	Ärztliche Leitung