


Produktanwendungsstandard: Hydrogelkompressen	WZ-PS-004 V12 Hydrogelkompressen	 Wundzentrum Hamburg - überregionales Wundnetz -
	gültig bis: 26.06.2026	

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Optimaler Einsatz des Produktes/dieser Produktgruppe, um Anwendungsfehler und ggf. daraus resultierende Folgeschäden zu vermeiden • Anwendergruppen arbeiten nach den gleichen Maßgaben mit den Materialien • Förderung des Wundheilungsprozesses und der Lebensqualität • Gewährleistung des wirtschaftlichen Einsatzes dieser Produkte

Eigenschaften
<ul style="list-style-type: none"> • Lindern Schmerzen durch anfänglich kühlenden Effekt • Sind rückstandsfrei entfernbar • Befeuchten trockene Wunden und halten austrocknungsgefährdete Wunde feucht • Unterstützen das autolytische Débridement • Gute Wundkontrolle durch die Transparenz der Wundaufgabe • Fördern die Granulation • Leichte Polsterfunktion

Indikationen
<ul style="list-style-type: none"> • Austrocknungsgefährdete Wunden • Wenig bis mäßig exsudierende Wunden • Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase • Oberflächliche, saubere Schürfwunden • Oberflächliche Verbrennungen 2. Grades • Zur Feuchthaltung bzw. Befeuchtung von freiliegenden Strukturen, z. B. Knochen-, Sehnen-, Muskelgewebe

Kontraindikationen
<ul style="list-style-type: none"> • Klinisch infizierte Wunden • Tiefe Pilzinfektionen • Verbrennungen 3. und 4. Grades • Stark exsudierende oder blutende Wunden • Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber dem jeweiligen Produkt oder seinen Bestandteilen

Anwendungshinweise
<ul style="list-style-type: none"> • Mindestens um 2 cm den Wundrand überlappend applizieren • Können ohne Kleberand und Haftbeschichtung auch bei Wunden mit Pergament-/Cortison-/Altershaut verwendet werden • Produkte ohne Kleberand benötigen eine Fixierung, z. B. elastischer Schlauchverband • Können kaum Exsudat aufnehmen • Verbandwechsel ist bei starker Einrübung des Produktes erforderlich • Dauer der Anwendung: je nach Wundzustand und Exsudation bis zu 7 Tage • Bei fraglicher allergischer Reaktion und keiner sicheren Abgrenzung einer Irritation: Karenz empfohlen bis zum Nachweis einer Allergie durch Epikutantest (Vorstellung Dermatologe) • Siehe aktuelle Produktinformationen: Packungsbeilagen, Beipackzettel, Umverpackung

Erstellt/Revidiert: Standardgruppe WZHH	Überprüft: Leiterin der Standardgruppe	Freigegeben: 2. Vorsitzende WZHH
Datum: 27.06.2024	Datum: 27.06.2024	Datum: 27.06.2024

Risiken/Komplikationen

- Unverträglichkeit/allergische Reaktion
- Mazeration der Umgebungshaut
- Hypergranulation
- Patienten mit Ulzerationen arterieller Genese empfinden den anfänglich kühlenden Effekt ggf. als schmerzhaft
- Patienten können die Transparenz des Produktes als unangenehm empfinden; ggf. zum Sichtschutz mit elastischem Schlauchverband fixieren

Aufbau und Zusammensetzung

- Bestehen aus einer semiokklusiven Folie mit aufgetragenem Hydrogel
- Enthalten bis zu 60 % gebundenes Wasser sowie z. B. Gelatine, Polysaccharide, Polymere aus Methacrylestern, Polyacrylamidpolymere, Polyelektrolytkomplexe

Hinweise

Protz K (2022). Moderne Wundversorgung, 10. Auflage, Elsevier Verlag, München

Vasel-Biergans A (2017). Wundauflagen für die Kitteltasche Band 1 und 2, 4. Auflage, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart

Erstellt	Geprüft auf Richtigkeit / Inhalt	Freigabe im Wundzentrum	Freigabe und Inkraftsetzung
27.06.2024	27.06.2024	27.06.2024	
Standardgruppe des Wundzentrum Hamburg e.V.	 Sabrina Fehrmann Ltg. Standardgruppe	 Kerstin Protz 2 Vorsitzende WZHH	PDL Ärztliche Leitung